

SYNTHESE DES VALEURS DES ANALYSES DE FOURRAGES D'HERBE 2017

MS	MAT	CB	Dig	NDF	ADF	ADL	Ca	P	Mg	UFL	UFV	PDIN	PDIE	PDIA
% MB	g/Kg	g/Kg	g/Kg	g/Kg	g/Kg	g/Kg	g/Kg	g/Kg	g/Kg	/Kg	/Kg	g/Kg	g/Kg	g/Kg

FOINS DE LUZERNE 1C fanés au sol

1er quartile	84,9	141	237	50,9	410	236	48	6,7	2,6	1,2	0,58	0,47	91	73	37
<b>moyenne</b>	<b>88,0</b>	<b>163</b>	<b>267</b>	<b>58,2</b>	<b>457</b>	<b>269</b>	<b>58</b>	<b>10,0</b>	<b>2,8</b>	<b>1,9</b>	<b>0,65</b>	<b>0,55</b>	<b>107</b>	<b>82</b>	<b>43</b>
3eme quartile	91,6	190	296	66,0	482	299	68	11,9	3,0	1,4	0,72	0,62	125	90	50

FOINS DE LUZERNE 2C fanés au sol

1er quartile	88,8	139	274	49,9	457	272	62	9,3	2,4	1,2	0,57	0,46	88	74	35
<b>moyenne</b>	<b>89,9</b>	<b>157</b>	<b>305</b>	<b>53,4</b>	<b>500</b>	<b>306</b>	<b>72</b>	<b>11,3</b>	<b>2,7</b>	<b>1,6</b>	<b>0,60</b>	<b>0,49</b>	<b>100</b>	<b>76</b>	<b>39</b>
3eme quartile	91,8	178	335	58,3	533	331	75	12,6	3,0	1,8	0,64	0,54	115	81	44

FOINS DE PNP 1C fanés au sol

1er quartile	90,4	66	269	48,5	552	285	36	3,8	1,6	1,3	0,66	0,56	42	66	21
<b>moyenne</b>	<b>91,6</b>	<b>89</b>	<b>289</b>	<b>55,1</b>	<b>589</b>	<b>309</b>	<b>42</b>	<b>5,1</b>	<b>2,0</b>	<b>1,6</b>	<b>0,72</b>	<b>0,63</b>	<b>58</b>	<b>75</b>	<b>28</b>
3eme quartile	93,1	102	316	60,1	628	336	50	5,9	2,4	1,8	0,76	0,68	66	81	33

FOINS DE PNP 2C fanés au sol

1er quartile	90,5	106	230	58,4	494	250	32	4,9	2,1	1,6	0,73	0,65	70	83	35
<b>moyenne</b>	<b>92,2</b>	<b>124</b>	<b>252</b>	<b>63,5</b>	<b>544</b>	<b>277</b>	<b>36</b>	<b>5,9</b>	<b>2,5</b>	<b>2,0</b>	<b>0,79</b>	<b>0,71</b>	<b>83</b>	<b>89</b>	<b>40</b>
3eme quartile	93,9	146	283	69,7	590	308	41	6,9	2,9	2,4	0,84	0,77	98	97	47

ENSILAGES DE RGI 1C préfanés

1er quartile	27,0	125	213	71,3	456	244	16	5,4	3,0	1,2	0,87	0,81	72	68	18
<b>moyenne</b>	<b>32,7</b>	<b>145</b>	<b>234</b>	<b>74,3</b>	<b>480</b>	<b>268</b>	<b>24</b>	<b>6,0</b>	<b>3,6</b>	<b>1,4</b>	<b>0,91</b>	<b>0,85</b>	<b>85</b>	<b>72</b>	<b>23</b>
3eme quartile	37,8	158	256	78,5	500	295	31	6,2	4,4	1,6	0,94	0,88	93	76	25

ENSILAGES DE RGI 2C préfanés

1er quartile	29,1	114	218	61,9	471	260	21	5,1	2,8	1,3	0,81	0,73	64	65	22
<b>moyenne</b>	<b>33,6</b>	<b>127</b>	<b>262</b>	<b>69,6</b>	<b>521</b>	<b>296</b>	<b>28</b>	<b>5,7</b>	<b>3,2</b>	<b>1,4</b>	<b>0,86</b>	<b>0,80</b>	<b>74</b>	<b>71</b>	<b>23</b>
3eme quartile	36,5	134	305	77,2	562	334	39	6,1	3,5	1,5	0,91	0,86	78	74	24

ENSILAGES DE MELANGES RGI 1C (70-80%) et TV (20-30%) préfanés

1er quartile	29,2	120	206	66,6	456	250	22	5,1	3,1	1,2	0,83	0,76	69	65	17
<b>moyenne</b>	<b>35,6</b>	<b>135</b>	<b>244</b>	<b>70,4</b>	<b>492</b>	<b>278</b>	<b>29</b>	<b>6,0</b>	<b>3,3</b>	<b>1,3</b>	<b>0,86</b>	<b>0,79</b>	<b>78</b>	<b>69</b>	<b>22</b>
3eme quartile	42,2	150	265	76,3	519	300	33	6,5	3,8	1,5	0,90	0,84	88	74	26

ENRUBANNAGE DE LUZERNE 1C

1er quartile	44,7	155	186	57,5	373	209	39	13,8	2,6	1,6	0,70	0,60	101	80	34
<b>moyenne</b>	<b>56,7</b>	<b>178</b>	<b>231</b>	<b>63,9</b>	<b>413</b>	<b>247</b>	<b>49</b>	<b>15,6</b>	<b>2,9</b>	<b>1,8</b>	<b>0,75</b>	<b>0,66</b>	<b>112</b>	<b>84</b>	<b>37</b>
3eme quartile	70,5	197	262	69,9	461	280	58	17,2	3,2	1,9	0,80	0,71	128	89	42

1C : première coupe, 2C : deuxième coupe

PNP : prairie naturelle de plaine, PNM : prairie naturelle de montagne, TV : trèfle violet, RGI : Ray grass italien